MAXIM®PSP

TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE

POUDRE

FONGICIDE

USAGE AGRICOLE

Poudre sèche pour le traitement des plantons de pommes de terre, utilisée pour la suppression de la rhizoctonie brun (*Rhizoctonia solani*), de la gale argentée (*Helminthosporium solani*) et de la pourriture sèche fusarienne (*Fusarium* spp.)

GARANTIE :
Fludioxonil.....0,5%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

ATTENTION **POISON**

N° D'HOMOLOGATION : **26647**
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : **10 kg**

Syngenta Canada inc.
140 Research Lane, Research Park
Guelph, Ontario
N1G 4Z3
Téléphone : 1-877-964-3682

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'EMPOISONNEMENT, consulter **IMMÉDIATEMENT** un médecin ou un centre antipoison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin **IMMÉDIATEMENT** pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer **IMMÉDIATEMENT** la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut être nocif en cas d'ingestion. Éviter d'inhaler la poussière. Se laver les mains et le visage après l'emploi. Ne pas contaminer la nourriture destinée à la consommation humaine ou animale. Entreposer au sec. Ne pas réutiliser. Ne pas contaminer les sources d'eau potable ou d'irrigation, lacs, cours d'eau et étangs.

Pendant le traitement, porter deux épaisseurs de vêtements (par exemple, une combinaison par-dessus un sous-vêtement long), un masque antipoussières et des bottes de travail. Porter

aussi des gants résistants au produits chimiques pour la manipulation du fongicide MAXIM® PSP TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE et des semences traitées.

Pendant le semis, porter deux épaisseurs de vêtements et des bottes de travail. Porter aussi des gants résistants au produits chimiques pour la manipulation des semences traitées.

Si vous prévoyez utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez a besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada au **www.croplife.ca**.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

1. Vider complètement le sac dans l'applicateur.
2. Rendre le sac vide inutilisable à tout usage additionnel.
3. Éliminer le sac conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN DÉVERSEMENT D'IMPORTANCE, UN INCENDIE OU UN EMPOISONNEMENT, COMPOSER LE 1-800-327-8633 (FASTMED)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MAXIM PSP TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE est un fongicide pour le traitement des plantons de pommes de terre; il réprime certaines maladies des pommes de terre transmises par les semences. MAXIM PSP TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE est efficace contre la rhizoctonie brun, y compris le chancre sur la tige et le stolon (*Rhizoctonia solani*), la gale argentée (*Helminthosporium solani*) et la pourriture sèche fusarienne (*Fusarium* spp.). MAXIM PSP TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE ne supprime pas les maladies bactériennes présentes dans les semences.

MAXIM PSP TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE doit faire partie intégrante d'une stratégie de lutte aux maladies des pommes de terre. Cette stratégie comprend l'utilisation de plantons de qualité supérieure et l'utilisation de techniques culturales appropriées, telles que : la rotation des cultures et la récolte des tubercules au moment optimal, de façon à réduire le plus possible le développement des maladies; la manipulation correcte des tubercules, afin d'éviter toute meurtrissure inutile; la gestion et la désinfection de l'équipement et des aires d'entreposage, de façon à réduire la présence de l'inoculum, y compris l'évitement de conditions d'entreposage permettant l'accumulation d'humidité et de condensation; et l'application du traitement des plantons de pommes de terre à des plantons propres, à l'aide d'un système d'application bien calibré.

NOTE : Le traitement de semences fortement endommagées ou rayées par la machinerie, ou encore de semences considérées de faible vigueur ou de qualité inférieure, peut se traduire par une réduction de la germination et/ou de la vigueur des semences et des pousses. Comme la

qualité des semences et les conditions d'entreposage des semences échappent au contrôle de Syngenta Canada inc., aucune garantie n'est offerte quant à la germination des plantons de pommes de terre.

MODE D'EMPLOI

POMMES DE TERRE (TRAITEMENT DES SEMENCES) – PLANTONS COUPÉS
Utiliser 500 g de produit pour 100 kg de plantons. Procéder à l'application dans un récipient approprié conçu pour le traitement des pommes de terre ou au moyen d'une saupoudreuse fixée au-dessus de la courroie. Les nouveaux plantons doivent être traités immédiatement après la coupe. Si les morceaux de semences doivent être mis en sac, ils devraient être entreposés pendant 2 à 3 jours dans des cageot ouverts avant d'être ensachés.

NOTE :
Pour une protection optimale contre la gale argentée, s'assurer que les tubercules des semences ne comportent aucun résidu de terre. Il est essentiel de traiter toute la surface des plantons. La suppression risque d'être moins efficace dans les champs où des plants de pommes de terre spontanés, résultant de la culture précédente, constituent une source de contamination. Consulter le guide provincial des cultures de pommes de terre pour connaître les recommandations.

GESTION DE LA RÉSISTANCE

Gestion de la résistance, MAXIM PSP TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE est un fongicide du groupe 12. Toute population fongique peut renfermer des individus naturellement résistants au MAXIM PSP TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE et à d'autres fongicides du groupe 12. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux fongicides:

Dans la mesure du possible, alterner MAXIM PSP TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE ou les fongicides du même groupe 12 avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes pathogènes. Afin de réduire le plus possible le risque d'apparition d'une résistance parmi les organismes visés, n'utilisez pas MAXIM PSP TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMMES DE TERRE pour traiter deux générations consécutives de semences.

Utiliser des mélanges en cuve contenant des fongicides ou bactéricides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.

Utiliser les fongicides ou bactéricides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, des relevés d'utilisations antérieures de pesticides et sur l'assolement, et faisant place à la possibilité d'intégrer des pratiques de labour (ou d'autres méthodes mécaniques) ou de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.

Inspecter les populations fongiques ou bactériennes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.

Lorsque la maladie continue de progresser après traitement avec ce produit, ne pas augmenter la quantité utilisée. Cesser d'employer le produit et passer à un autre fongicide ou bactéricide ayant un site ou un mode d'action différent, si possible.

Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.

Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à nom du représentant de la compagnie au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) ou à www.syngenta.ca.

MAXIM® est une marque déposée d'une compagnie du groupe Syngenta.